

#### A USTED EL PACIENTE:

- Muestrele esta tarjeta a su farmacéutico
  - Muestrele esta tarjeta a su proveedor de servicio de la salud
- Esto les ayudará a darle la medicina correcta en el momento correcto.

**TIKOSYN**  
500 mg  
250 mg  
125 mg  
62.5 mg  
*(dofetilide)*  
oral

para sus Farmacéuticos y  
Profesionales de la Salud

## TIKOSYN TARJETA DE INFORMACIÓN

Para reducir el riesgo de arritmias ventricular grave, los pacientes que hayan sido iniciados o reiniciados en **TIKOSYN**<sup>®</sup> (dofetilide) deben permanecer un mínimo de 3 días en una institución que pueda proporcionar:

- valores de aclaración de creatina
- vigilancia de electrocardiográfica (EKG) continua, y
- resucitación cardiaca

Los efectos secundarios más comunes de Tikosyn son dolor de cabeza, dolor de pecho, y mareos.



TK207150 ©2004 Pfizer Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE.UU./ Agosto 2004

#### RECETA:

Mi médico ha recetado **TIKOSYN**<sup>®</sup> (dofetilide).

- Tikosyn sólo puede ser recetado por un profesional que haya completado un programa de educación de Tikosyn.

- La receta sólo puede ser surtida por una farmacia

matriculada para la venta o la farmacia designada para surtirla por correo.

Mi dosis actual es de \_\_\_\_\_ mg \_\_\_\_\_ veces al día.

**AL FARMACÉUTICO:**

Tikosyn está disponible sólo mediante el programa T. I. P. S.™ (Tikosyn en el Sistema de Farmacia).

**PARA MÁS INFORMACIÓN**

por favor llame al 1-877-TIKOSYN (845-6796)  
o visite nuestra sede de Internet [www.tikosyn.com](http://www.tikosyn.com)

**1-877-TIKOSYN**

Tikosyn no es para todos. Por favor vea la información completa sobre como recetar el medicamento. Esta contiene información importante acerca del riesgo de arritmias ventricular grave que Tikosyn puede causar. El riesgo puede ser aumentado por ciertas interacciones entre ciertos medicamentos.

**PARA MÁS INFORMACIÓN**

por favor llame al 1-877-TIKOSYN (845-6796)  
o visite nuestra sede de Internet [www.tikosyn.com](http://www.tikosyn.com)